

APICOLTURA

TABELLA DEGLI ACARICIDI CONSENTITI IN ITALIA - 2012

	Apistan® Vita Europe	ApiLife Var® Chemicals Laif	Apiguard® Vita Europe
Principio attivo	Tau-fluvalinate (*)	Timolo,levomentolo,eucalpt o olio,canfora racemica	Timolo
Periodo di trattamento	E' più efficace in assenza di covata, quindi inizio autunno -fine inverno. Può esser usato in estate.	Estate Intervenire dopo aver tolto i melari	Estate Intervenire dopo aver tolto i melari
Tempo di sospensione	0 giorni non trattare le api durante il periodo di produzione del miele	0 giorni	0 giorni per il miele
Temperatura esterna	Conservare il prodotto a temperatura inferiore di 40 °C Nessuna indicazione sulla temperatura d'uso	Temperatura esterna ideale 20-25°C. Oltre i 30°C si può avere un eccesso di evaporazione, mal tollerato dalle api. Sotto 15°C ci si può attendere una efficacia insufficiente. Effettuare i trattamenti sempre la sera o il mattino presto evitando le ore più calde della giornata.	Non oltre i 30°C Non sotto i 15°C Il prodotto è ben tollerato alle alte temperature, mentre la sua efficacia può risultare ridotta sotto 25°C.
Dosaggio	2 strisce per alveare poste entro i telaini 3 e 4 e 7 e 8 in un periodo compreso tra 6 e 10 settimane a seconda delle condizioni ambientali e della presenza o meno di covata	1 tavoletta per alveare ogni 7gg per 4 volte consecutive. Per permettere alla api di tollerare meglio il prodotto, porre un pezzo di tavoletta sui favi, la sera precedente il trattamento.	1 vaschetta da 50 gr di gel per alveare per due volte a distanza di 14 giorni
Somministrazione	Inserire tra i favi. Mantenere le strisce in loco per 6-10 settimane. Mantenerle oltre le 6-10 settimane può favorire l'avvio di di eventuali processi di resistenza.	Spezzare la tavoletta in 3- 4 parti e porre ogni parte sui listelli dei telaini agli angoli dell'arnia lontano dalla covata. Non utilizzare contemporaneamente con altri farmaci anti-varroa.	Strappare il coperchio e porre la vaschetta sopra i favi. Rovesciare il coprifavo in modo che si formi un'intercapedine che possa accogliere la vaschetta.
Precauzioni	Assenza di melario Non utilizzare a scopi alimentari il miele raccolto durante il trattamento	Assenza di melario Usare il prodotto su famiglie forti. Evitare il trattamento durante un saccheggio. Rimuovere i residui alla fine del trattamento.	Assenza di melario Non utilizzare quando l'attività della colonia è molto debole.
Effetti indesiderati	<i>Farmaco-resistenza</i> Non utilizzare la cera del nido prima che siano trascorsi 180 giorni dalla sospensione del trattamento. Se il prodotto è usato per il trattamento estivo, va considerato che il prodotto non è efficace sulla varroa presente nella covata.	Fuoriuscita delle api dall'arnia, se la temperatura esterna è troppo elevata. Cercare di abituare le api ponendo un pezzo di tavoletta la sera precedente il trattamento. Blocco di deposizione Odori anomali a cera e miele	Nessuna efficacia del prodotto se l'attività della colonia è molto debole. Odori anomali a cera e miele A dosi superiori si potrebbero avere disturbi nel comportamento della colonia (agitazione, fughe, aumento della mortalità)

Avvertenze	Il prodotto può dare sensibilizzazione nell'operatore	Evitare l'inalazione, l'ingestione ed il contatto con la pelle	Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Non inalare.
Confezione	Busta con 10 strisce	Busta con due tavolette	Scatola da 10 vaschette
Ricetta	No Conservare i documenti di acquisto del prodotto	No Conservare i documenti di acquisto del prodotto	No Conservare i documenti di acquisto del prodotto
Apicoltura Biologica	No	Sì	Sì
Costo indicativo	10 str. Euro 23,00-30,00	1 sacc. 2tav. 2.00-3.95 Euro	10 vasc. 50g/cad. Euro 26,00 Secch. 3kg Euro 162,00

TABELLA DEGLI ACARICIDI CONSENTITI IN ITALIA - 2012

	Apivar® Laboratories Biovè S.A.	Api Bioxal® Chemicals Laif
Principio attivo	Amitraz (*)	Ac. Ossalico biidrato
Periodo di trattamento	Estate Preferibilmente in assenza di covata	Utilizzo in estate con blocco di covata artificiale. In inverno con blocco di covata naturale. La presenza di covata può ridurre sensibilmente l'efficacia del prodotto.
Tempo di sospensione	0 giorni	0 giorni per il miele
Temperatura esterna	Nessuna indicazione d'uso	Nessuna indicazione d'uso
Dosaggio	Due strisce ogni arnia da 10 telaini. Lasciare le striscia in loco per 6 settimane.	Busta da 35 g per 10 alveari da sciogliere in 500 cc di sciroppo Busta da 175 g per 50 alveari " " " 2,5 litri " " Busta da 350 g per 100 alveari " " " 5,0 litri " " Per gocciolamento: 5ml/favo coperto di api in un'unica somministrazione (dose massima 50 ml/alveare). Preparazione dello Sciroppo : miscelare acqua e saccarosio (comune zucchero da cucina) in parti uguali. Per sublimazione: 2,3 g/alveare X 3 minuti di trattamento e 10 minuti di chiusura dell'arnia, successivi al trattamento.
Somministrazione	2 strisce per alveare: inserire le strisce tra due telaini dell'arnia composta da 10 favi.	Per gocciolamento: gocciolare la soluzione con una siringa, sopra i favi, trasversalmente alla loro direzione. Per sublimazione: sublimare la polvere in un sublimatore a resistenza elettrica. Versare la dose di polvere nel sublimatore spento. Introdurre l'apparecchio profondamente, attraverso l'apertura di volo, evitando il contatto coi favi. Sigillare per evitare la fuoriuscita delle api e dei fumi. Dopo ogni utilizzo raffreddare e ripulire l'apparecchio con acqua potabile. Effettuare il trattamento su tutto l'apiario e in assenza di melari.

Precauzioni	Non ingerire ed evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto. Assenza di melario	Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto. Preparare di volta in volta la giusta quantità di soluzione occorrente per il trattamento col gocciolato. Non ingerire, evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, non inalare. Proteggersi sempre con maschera protettiva tipo FFP2, guanti impermeabili e occhiali protettivi nelle fasi pre, durante e post trattamento. Maneggiare la polvere con la stessa precauzione.
Effetti indesiderati	Efficacia discontinua Farmaco-resistenza	La colonia può agitarsi durante il trattamento. Ogni effetto indesiderato va segnalato al veterinario.
Avvertenze	Indossare i guanti ed evitare di bere, mangiare e fumare durante la manipolazione delle strisce. Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici	<i>N.B. L'utilizzo per sublimazione, è meno efficace che per gocciolamento e più pericoloso per l'operatore/veterinario.</i> <i>I microcristalli di ossalico prodotti dalla sublimazione permangono dentro l'arnia anche a distanza di tempo dal trattamento. L'operatore /il veterinario dovranno quindi proteggersi sempre durante le visite successive per evitare di inalare i microcristalli di acido ossalico dannosi per la mucosa respiratoria. L'inalazione dei microcristalli può avvenire in concomitanza anche soltanto del controllo del fondo dell'arnia.</i>
Distributore per l'Italia	ZOOTECNICA s.n.c. SAVIGNANO (FC) 0541 – 945467/944788	Chemicals Laif srl - Via dell'Artigianato,13 - 35010 Vigonza (PD) 049 - 626281 - info@chemicalslaif.it
Confezione	10 strisce per confezione	Busta da 35 g per 10 alveari da sciogliere in 500 cc di sciroppo Busta da 175 g per 50 alveari " " " 2,5 litri " " Busta da 350 g per 100 alveari " " " 5,0 litri " "
Ricetta	SI', semplice non ripetibile Conservare i documenti di acquisto del prodotto e fotocopia della ricetta per 5 anni Acquisto in farmacia	NO Conservare i documenti di acquisto del prodotto Acquisto nelle rivendite autorizzate
Apicoltura Biologica	No	Si
Costo indicativo	Euro 33.00 10 strisce	Da 8,00 a 14,00 Euro la busta per 10 alveari

(*) principi attivi che possono generare farmaco-resistenza nell'acaro

In corsivo avvertenze per la salute dell'Operatore/Veterinario a cura della FNOVI